

LA DEMENZA è il declino cognitivo con particolare compromissione della memoria, della ragione astratta e delle funzioni esecutive.

DEMENZE

CORTICALI

CORTSOTTOCORTICALIICALI

Sono le demenze dovute ad alterazioni della corteccia cerebrale come la malattia di Alzheimer, quella di Pick e quella di Creutzfeldt-Jakob

Sono le demenze dovute ad alterazioni della struttura cerebrale che si trovano al di sotto della corteccia cerebrale. Esse vengono associate a patologie extrapiramidali o sclerosi multipla, Parkinson e demenze vascolari o arteriosclerotiche.

LE CARATTERISTICHE DELLE DEMENZE CORTICALI E SOTTO-CORTICALI

<i>Caratteristiche</i>	<i>SOTTO-CORTICALI</i>	<i>CORTICALI</i>
Linguaggio	Afasia precoce	Non afasia
Memoria	Memoria e riconoscimento danneggiate	Memoria danneggiata; riconoscimento normale o preservato meglio della memoria
Visuospaziale	Danneggiato	Memoria danneggiata; riconoscimento normale o preservato meglio della memoria
Capacità di calcolo	Danneggiata	Memoria danneggiata; riconoscimento normale o preservato meglio della memoria
Sistemi frontali	Danneggiati in maniera consistente	Memoria danneggiata; riconoscimento normale o preservato meglio della memoria



NAPOLI ONLUS

LA MALATTIA DI ALZHEIMER

L' Alzheimer, è una condizione di **deterioramento mentale**, che porta ad un progressivo sviluppo di deficit cognitivi tali da compromettere :

- **la produttività,**
 - **l'autonomia**
 - **le capacità adattive**
- della persona che ne è affetta

LA COMPARSA DELLA MALATTIA

La comparsa dei primi segni della Malattia può avvenire in seguito ad un incidente stradale, un intervento chirurgico, o un trauma psicologico. I familiari tendono, erroneamente, ad attribuirne la causa della malattia, ma è bene sapere che tale coincidenza temporale non è di natura causale.

La malattia era già presente, solo che ancora non si era rivelata.

I SINTOMI COGNITIVI

In generale i sintomi vengono distinti in cognitivi ed extra-cognitivi.

I **SINTOMI COGNITIVI** corrispondono ai deficit di memoria che compromettono in modo progressivo lo status familiare, sociale e professionale della persona che ne è affetta. Essi sono i seguenti:

I SINTOMI COGNITIVI	
<i>AFASIA</i>	disturbo del linguaggio inteso come difficoltà a tradurre il pensiero in linguaggio e viceversa.
<i>APRASSIA</i>	ridotta capacità ad eseguire movimenti finalizzati nonostante appaiono mantenute la coordinazione e la forza dei movimenti e la comprensione del significato del compito da eseguire.
<i>FUNZIONAMENTO ESECUTIVO</i>	difficoltà a pianificare, iniziare, eseguire, controllare e interrompere un comportamento complesso.

I SINTOMI EXTRA-COGNITIVI

I SINTOMI EXTRA-COGNITIVI sono i disturbi comportamentali che peggiorano ulteriormente il livello di autonomia, già compromesso a causa dei deficit cognitivi.

Essi sono i seguenti:

I SINTOMI EXTRA-COGNITIVI	
<i>ALTERAZIONI DELL'UMORE</i>	ansia, depressione, euforia e/o labilità emotiva
<i>SINTOMI NEUROVEGETATIVI</i>	alterazioni del sonno e dell'appetito
<i>DISTURBI DELL'ATTIVITÀ PSICOMOTORIA</i>	vagabondaggio, affaccendamento a finalistico
<i>AGITAZIONE</i>	aggressività verbale o fisica, vocalizzazione persistente
<i>ALTERAZIONI DELLA PERSONALITÀ</i>	indifferenza, apatia, disinibizione, irritabilità

LE FASI E LA DURATA

Dal punto di vista sintomatologico l'AD ha generalmente un inizio subdolo ed un decorso cronico e progressivo.

Sebbene le modalità d'esordio ed il percorso clinico siano variabili da paziente a paziente, è possibile descrivere un percorso clinico caratteristico. La malattia, infatti, viene arbitrariamente distinta in tre fasi temporali anche se ci sono molte differenze individuali nel modo in cui essa progredisce:

FASI	DURATA
Lieve	2 - 3 anni
Moderata	4 - 5 anni
Grave	2 - 3 anni

LE FASI E I SINTOMI

FASI	LIEVE	MODERATA	GRAVE
S I N T O M I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Difficoltà di linguaggio ▪ Perdite significative della memoria (soprattutto quella recente) ▪ Disorientamento temporale ▪ Non riconoscimento di luoghi familiari ▪ Difficoltà nel prendere decisioni ▪ Perdita d'iniziativa e motivazione ▪ Segni e sintomi di depressione e aggressività ▪ Perdita di interesse verso i propri hobby e le proprie attività. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdita della memoria di eventi recenti e nomi di persone ▪ Mancata autosufficienza (è incapace di cucinare, pulire o fare acquisti) ▪ Può diventare estremamente dipendente ▪ Necessita di assistenza per lavarsi e vestirsi ▪ Ulteriori difficoltà del linguaggio ▪ Tendenza a smarrirsi ed esibisce altri disturbi comportamentali ▪ Può presentare allucinazioni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Difficoltà nell'alimentarsi ▪ Perdita della capacità di riconoscere persone e oggetti ▪ Perdita della capacità di riconoscere i percorsi (anche quelli più abituali) ▪ Incontinenza per feci e urine ▪ Può necessitare di sedia a rotelle o allettarsi

LE NOSTRE SEDI

- **Via Cinthia, 45 - 80126 Napoli (sede legale)**

- **Centro Ascolto:** Strada Comunale del Principe 16/A Plesso Centrale presso ex Ospedale Frullone Tel/Fax 081/7400245
N. VERDE 800.09.85.46
dalle 9.00 alle 13.00